

NEW-BRONK-GUMBOR-REO

VACUNA INACTIVADA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE NEWCASTLE, BRONQUITIS INFECCIOSA DE LAS AVES, GUMBORO Y ARTRITIS VIRAL

INACTIVADA Y MICROEMULSIONADA

USO VETERINARIO

INDICACIÓN:

Inmunización de las gallinas reproductoras livianas y pesadas contra la Enfermedad de Newcastle, Bronquitis Infecciosa de las Aves, Gumboro y de Artritis Viral Aviar.

COMPOSICIÓN:

Suspensión del virus de la enfermedad de Newcastle, muestra lentogénica La Sota, con título mínimo antes de la inactivación de $10^{8.3}$ DIOE₅₀/dosis, suspensión del virus de la Bronquitis Infecciosa de las Aves, muestra H-120, con título mínimo antes de la inactivación de $10^{5.3}$ DIOE₅₀/dosis, suspensión del virus de Gumboro, muestra intermedia, GBV-8, con título mínimo antes de la inactivación de $10^{5.8}$ DIOE₅₀/dosis, suspensión del virus de Gumboro, muestra 1084E, con título mínimo antes de la inactivación de $10^{5.8}$ DIOE₅₀/dosis, suspensión conteniendo Reovirus Aviar, muestra S1133, con título mínimo antes de la inactivación de $10^{3.5}$ DIOE₅₀/dosis, suspensión conteniendo Reovirus Aviar, muestra 1733, con título mínimo antes de la inactivación de $10^{3.5}$ DIOE₅₀/dosis, suspensión conteniendo Reovirus Aviar, muestra 2408, con título mínimo antes de la inactivación de $10^{3.5}$ DIOE₅₀/dosis.

MODO DE USAR:

La vacuna es administrada por vía intramuscular, en el músculo del pecho, con una dosis de 0,5mL, usando una aguja 10x10 o 10x8. Se recomienda cambiar la aguja a cada 500 aves.

La mejor época para la aplicación de New-Bronk-Gumbor-Reo en las aves es cuando las aves están entre 14 y 18 semanas de edad. El uso de esta vacuna, todavía, puede ser modificado, a discreción del Médico Veterinario responsable por la aplicación.

IMPORTANTE

Sólo vacunar aves sanas. No vacunar 21 días antes del sacrificio.

Conservar el producto entre 2°C y 8°C. No congelar el producto.

Al momento de la aplicación el producto deberá estar entre 20°C y 30°C, con el fin de facilitar su utilización.

Agitar antes y durante el uso. Una vez abierto el frasco, la vacuna no se conserva.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

La inoculación accidental de vacuna aceitosa, en el hombre, puede causar seria reacción local. El servicio médico deberá ser avisado inmediatamente e informado de que se trata de una vacuna de emulsión aceitosa.

Venta bajo prescripción del Médico Veterinario.

El uso de esta vacuna debe estar bajo supervisión de un Médico Veterinario.

Licenciado en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento con el nº 8352 el 15/10/02.

Resp. Téc. Méd. Vet.:

Dr. Antonio Roberto Alves Corrêa

CRMV-SP nº 1431

Propietario/Fabricante:

Laboratório Bio-Vet S/A

R. Cel. José Nunes dos Santos, 639

06730-000 - Vargem Grande Paulista - SP

CNPJ 60.411.527/0001-30

INDUSTRIA BRASILEÑA