

AviPro® ND-IB VIBANCO.

VACUNA VIRUS VIVO CONTRA EL NEWCASTLE Y LA BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR.


DESCRIPCIÓN: AVIPRO® ND-IB VIBANCO, es una vacuna a virus vivo, propagada en embriones de pollo, presentada en forma congelada-desecada (liofilizada) en un frasco de vidrio.

COMPOSICIÓN: Su composición garantizada contenida en el producto final por dosis es:

1. Virus de Newcastle Tipo B1 Cepa B1, con un título mínimo de $10^{5.5}$ DIE 50.
2. Virus de Bronquitis Tipo Mass, Cepa M48, con un título mínimo de $10^{3.1}$ DIE 50.

INDICACIONES DE USO: Este Producto se recomienda en la prevención de la enfermedad de Newcastle y bronquitis infecciosa aviar tipo Massachusetts. La vacunación se recomienda para aves de 1 día a 5 semanas de edad o menores por la ruta de agua de bebida o aspersión en incubadora o en campo, y a las 6 semanas de edad por el método de aspersión gota gruesa.

CONDICIONES RECOMENDADAS DE ALMACENAMIENTO: Almacenar entre 2 a 7°C o 35 y 45°F. No congelar.



PREPARACIÓN DE LA VACUNA: Quite el sello de aluminio y el tapón del frasco de la vacuna. Vierta algo de diluyente en el frasco, luego coloque el tapón de goma y agite para homogenizar. Vierta la vacuna mezclada en el frasco que contiene el resto del diluyente y agite de nuevo para homogenizar. No abra o mezcle la vacuna hasta el momento de emplearla.

MÉTODO DE VACUNACIÓN: La vacuna puede administrarse en los orificios nasales (intranasal) o en el ojo (intraocular) o en el pico (oral). Los métodos de aplicación son: individual, agua de bebida, o aerosol por aspersión gota gruesa.

PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. Una vez preparado el producto gastar todo su contenido. Los envases vacíos y todo contenido sin usar debe ser desecharado adecuadamente según las disposiciones de manejo de residuos biológicos. Efectos secundarios no se conocen, e interacciones con otros productos no se conocen. No vacune en los 21 días previos al sacrificio. Todas las aves susceptibles de una granja deben ser vacunadas al mismo tiempo. Evite la contaminación de manos, ojos y ropa con la vacuna.

PRESENTACIONES: Frascos de vidrio con liofilizado de 10 ml con 2500 dosis y 30 ml con 10.000 dosis para reconstituir.

Registró ICA COLOMBIA No 8987 BV